



PACT Gastroenterology Center
Hamden • Milford • Guilford



Cómo prepararse para su colonoscopia con el Kit Suflave

Siga únicamente estas instrucciones (ignore las instrucciones que vienen con el kit). Por favor, lea estas instrucciones atentamente tan pronto como las reciba.

Recuerde que su cita podría ser reprogramada o cancelada si:

- **No finaliza su preparación o no sigue adecuadamente las instrucciones de preparación que se indican a continuación.**
- **Consuma cualquier alimento o bebida en el lapso de 3 horas antes de su horario de llegada.**
- **No llega a su cita a tiempo.**
- **No tiene quien lo lleve a casa.** En el momento de su colonoscopia, se le administrarán medicamentos que afectarán su juicio y sus reflejos. No podrá conducir, y solo podrá irse en taxi o usar el servicio de autobús si tiene un adulto responsable de 18 años de edad o más que lo acompañe.
- **Hay un cambio en la cobertura de su seguro de salud.** Es posible que su nuevo plan requiera que obtengamos autorización antes de realizar su colonoscopia, un proceso que puede llevar algo de tiempo. Por favor, notifíquenos sobre cualquier cambio en su seguro de inmediato.

Una semana antes de su colonoscopia...

1. **Obtenga su receta de Suflave si aún no lo ha hecho.** Si su farmacia no lo contacta con respecto a esta receta, por favor llámelos para verificar si está lista o cuándo estará lista para retirarla. Si no se recibió una receta, no está cubierta por su aseguradora o es demasiado costosa, llame al (203) 281-4463, ext. 5152 para hablar con nuestra línea de recetas.
2. **Compre los artículos para la dieta de líquidos claros:**
 - Caldo transparente o *bouillon*
 - Soda, Gatorade (amarillo o transparente) o jugo de frutas transparente (manzana, uva blanca, limonada)
 - Paletas heladas (no de color púrpura, rojo o naranja) o postre helado italiano (limón o lima)
 - Jell-O (no de color púrpura, rojo o naranja)
 - Café o té (sin leche, crema o productos lácteos)
3. **Haga los arreglos de transporte hacia y desde su colonoscopia.** No se le permitirá conducir. No podrá tomar un taxi o autobús si no tiene un adulto responsable de 18 años de edad o más que lo acompañe.
4. **Consulte las instrucciones brindadas por el consultorio sobre cambios en la medicación para el procedimiento. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el consultorio.**
5. Deje de tomar suplementos de hierro (las multivitaminas que contienen hierro se pueden tomar).
6. **Debe comprar un frasco de Infant's Mylicon (solo si la casilla está marcada).**

Tel: 203-281-4463

www.pactmd.com

Fax: 203-287-2930

2200 Whitney Avenue Suites 330 & 360
Hamden CT 06518

40 Commerce Park
Milford CT 06460

1591 Boston Post Road Suite 206
Guilford CT 06437

Un día antes de su colonoscopia...

1. **Al despertarse**, comience la dieta de líquidos claros::
 - Nada de alimentos sólidos hasta después de su procedimiento
 - Agua
 - Caldo transparente o *bouillon*
 - Soda, Gatorade (amarillo o transparente) o jugo de frutas transparente (manzana, uva blanca, limonada)
 - Paletas heladas (no de color púrpura, rojo o naranja) o postre helado italiano (limón o lima)
 - Jell-O (no de color púrpura, rojo o naranja)
 - Café o té (sin leche, crema o productos lácteos)
 - No hay límite sobre la cantidad de líquidos claros que bebe durante el día.
2. **Por la mañana**
 - Abra un paquete de mejora de sabor y vierta el contenido en un frasco proporcionado.
 - Llene el frasco con agua tibia hasta la línea de llenado.
 - Cierre el frasco con la tapa y agite suavemente hasta que todo el polvo se haya disuelto.
 - Refrigere la solución.
3. **A las 3pm por la tarde**
 - Consuma 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que el frasco esté vacío.
 - Llene el frasco proporcionado hasta la mitad con agua (16 oz) y consúmlalo durante la tarde.
 - Añada 6 ml de Infant's Mylicon a las últimas 16 oz de agua (solo si la casilla está marcada)
4. **Por la noche antes de acostarse**
 - Abra el segundo paquete de mejora de sabor y vierta el contenido en el segundo frasco proporcionado.
 - Llene el frasco con agua tibia hasta la línea de llenado.
 - Cierre el frasco con la tapa y agite suavemente hasta que todo el polvo se haya disuelto.
 - Refrigere la solución.

El día de su colonoscopia...

1. **Nada de alimentos sólidos hasta después de su procedimiento**
2. **5 horas antes de su horario de llegada:**
 - Consuma 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que el frasco esté vacío.
 - Llene el frasco proporcionado hasta la mitad con agua (16 oz) y consúmlalo.
 - Añada 6 ml de Infant's Mylicon a las últimas 16 oz de agua (solo si la casilla está marcada)
3. **3 horas antes de su horario de llegada, deje de consumir cualquier cosa por la boca (líquidos o sólidos).**
4. Asegúrese de llegar a tiempo para su cita.